Click to verify

التهاب البنكرياس الحاده acg إرشادات ممارسة

[illegible]

الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحاد هي وجود حصوات في المرارة، والإفراط في تناول الكحول، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم بشكل مفرط. تسد حصوات المرارة القناة الصفراوية، مما يسبب [illegible] (التهاب الوتين) فشل مسرعتر هاب الأعضاء أكثر شيوعًا (تعفنو لهيصاب الأعضاء والعضلات أكثر. [illegible] الالتهاب. يؤدي تعاطي الكحول إلى إتلاف البنكرياس، مما يؤدي إلى الالتهاب. كما أن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم يؤدي إلى الالتهاب أيضًا. يعتمد انتشار كل سبب من أسباب التهاب البنكرياس الحاد على المنطقة الجغرافية والطبقة الاجتماعية.بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، هناك بعض العوامل النادرة وغير الشائعة التي قد تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد، مثل: إصابة جسدية التهاب البنكرياس المناعي الذاتي من النوع الأول (مرض جهاري مرتبط بـ [illegible] ,G A و IgG1) والنوع التايفيروس كوكساكي، فيروس تضخم الخلايا، فيروس إبشتاين بار، فيروسات التهاب الكبد [illegible] بعد التشخيص والتدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة التهاب البنكرياس الحاد. ومن أهم النقاط التي يجب فهمها فهم الأغراض والأسباب وخيارات العلاج. يمكن للتدخل المبكر منع المضاعفات وتحسين النتائج.تم تجهيز مستشفيات باشودا في حيدر آباد بمرافق طبية متقدمة وتكنولوجيا حديثة لتوفير رعاية شاملة للمرضى المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد. يقوم فريق الأطباء ذوي الخبرة بتشخيص الحالة وعلاجها بشكل فعال، وإدارة المضاعفات مثل اختلال توازن السوائل والالتهابات. تقدم مستشفيات باشودا أيضًا علاجات متقدمة مثل [illegible] وحدة للأكسجة ECMO للتعافي. [illegible] التهاب البنكرياس الحاد، يجب على المرضى تجنب تناول الطعام فقط بوصي طبيبك بأنبوب تغذية لمساعدتك في الحصول على التغذية. 2. أدوية لتخفيف الألم يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا، لذا سيعطي فريق الرعاية الصحية الخاص بك الأدوية للمساعدة في السيطرة على الألم. 3. السوائل الوريدية نظرًا لأن جسمك يخصص الطاقة والسوائل لإصلاح البنكرياس فقد تصاب بالجفاف، لهذا السبب ستتلقى سوائل إضافية من خلال الوريد في ذراعك [illegible] فلل من استهلاك الكحول. تناول نظامًا غذائيًا [illegible] يحذر السيطرة على التهاب البنكرياس يمكنك البدء في شرب السوائل الصافية وتناول الأطعمة الخفيفة، ومع مرور الوقت يمكنك العودة إلى نظامك الغذائي المعتاد. إذا استمر التهاب البنكرياس لديك وما زلت تعاني من الألم عند تناول الطعام فقد يوصي طبيبك بأنبوب تغذية لمساعدتك في الحصول على التغذية. 2. أدوية لتخفيف الألم يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا، لذا سيعطي فريق الرعاية الصحية الخاص بك الأدوية للمساعدة في السيطرة على الألم. 3. السوائل الوريدية نظرًا لأن جسمك يخصص الطاقة والسوائل لإصلاح البنكرياس فقد تصاب بالجفاف، لهذا السبب ستتلقى سوائل إضافية من خلال الوريد في ذراعك [illegible] فلل من استهلاك الكحول. تناول نظامًا غذائيًا قليل الدسم. تمرن بانتظام. خفف من الوزن الزائد. تخطى الأنظمة الغذائية القاسية. لا تدخن.